

PRIMER PAS



RCP INFANTS

Assegure-vos que té la via oberta,inclineu-li el cap,poseu els dits a la barbeta i aixequieu-la.Si és fàcil ,traieu les obstruccions visibles de la boca amb les puntes dels dits



SEGÓN PAS

subjecteu-li el nas. Inspireu,segelleu els llavis al voltant de la boca i insufleu-li aire a la boca
continuament ;el pit se li hia d'inflar.



TERCER PAS

Traieu la boca,però no les mans,i observeu que el pit es desinfla(boca a boca).cada boca a boca complet ha de durar un segon.
repetir-lo cinc vegades

QUART PAS

Inicieu les compressions toràciques.poseu la part inferior del palmell al centre del pit de l'infant ,aboqueu-vos sobre l'infant,premeu verticalment per enfonsar l'estern un terç de la seva profunditat com a minim.



CINQUE PAS

Deixeu de fer-hi pressió ,però no moveu la mà,deixeu que el pit torni al seu lloc.
feu 15 compressions,du rant un minut sino hi ha signes de vida trucar al

112



SISÈ PAS

Torneu al cap de l'infant i feu el boca a boca dues vegades,i 15compressions toràciques més. continueu a 15:2 fins que arribin els serveis d'emergències ,l'infant mostri signes de consciència(tus,obre els ulls i es mou intencionadament)i respiri amb normalitat o estigueu exhaust per continuar.

Si l'infant mostra signes de consciència i respira amb normalitat poseu-lo en posició de PLS i controleu pols i respiració fins que arribi l'ajuda

